


FOCUS SUR LA PREVENTION DU TABAGISME ET L'AIDE AU SEVRAGE TABAGIQUE

LORS DE L'ENTRETIEN INDIVIDUEL EN SST DE LA MSA



AUTEURE : Dr Sylvie COURTY¹

1/médecin du travail, Mutualité Sociale Agricole Berry-Touraine

CONTEXTE ET OBJECTIFS

28,2 % de fumeurs réguliers ou quotidiens parmi les 15-75 ans. Entre 2010 et 2014, tendance à la baisse du nombre de fumeurs et de leur consommation mais persistance des inégalités sociales.

Les ouvriers : toujours les plus nombreux à fumer (37,8%) mais prévalence stable. Idem chez les artisans, commerçants, chefs d'entreprise (27,9%) et les CSP+(18,9%). Les employés (majoritairement des femmes) fument moins (29,2% vs 31,1% en).

Les agriculteurs exploitants : seule CSP pour laquelle le nb de fumeurs a augmenté depuis 2010 (20,6% vs 12,2%). Les agriculteurs les plus jeunes (40-49 ans) ont un tabagisme similaire à celui des tertiaires.

Comment les professionnels de Santé au Travail des MSA appréhendent et souhaitent répondre à cette problématique du tabagisme lors des 350 000 consultations qu'ils réalisent chaque année ?


RÉSULTATS

Etude descriptive menée auprès des 336 Médecins et 116 Infirmier(e)s du Travail des 34 SST des caisses de MSA et de la Caisse Centrale.


Questionnaire dédié, diffusé par mailing du 29/06 au 31/07/2017.

- 194 répondants, soit 43% de taux de participation
- 68% médecins
- 72% femmes
- 54% ont moins de 5 ans d'expérience en SST
- 13% ont une formation en addictologie ou tabacologie
- 11% fumeurs


Lors de l'entretien individuel, abordez-vous le tabagisme ?




Abordez-vous le tabagisme en fonction ?




Dans ce cas, abordez-vous le tabagisme chez les sujets ayant les risques suivants ?




Lors de l'entretien individuel, posez-vous la question suivante ?



Saviez-vous qu'il vous est possible de prescrire les substituts nicotiques ?



Pourquoi ne prescrivez-vous pas ?



CONCLUSION ET PERSPECTIVES

- Abord du tabagisme quasi systématique lors des consultations.
- Sentiment de moindre efficacité.
- Forte demande de formation et de connaissance des réseaux d'aide au sevrage.

Outils d'aide possibles pour les MDT et les IDEST : documents « Arrêter de fumer avec les substituts nicotiques » de la MSA, « Outil d'aide au repérage précoce et à l'intervention brève (alcool, cannabis, tabac chez l'adulte) » et « L'algorithme : Du dépistage à la mise en place d'un traitement de l'aide à l'arrêt de la consommation de tabac » de l'HAS.