

Comment mettre son masque ?



- Placer le demi-masque sous le menton et s'assurer que les deux élastiques sont bien séparés. Les passer derrière la tête.
- Positionner l'élastique inférieur en dessous des oreilles et l'élastique supérieur au dessus des oreilles.
- Ajuster les parties inférieures et supérieures pour qu'elles s'adaptent parfaitement au visage.
- Adapter la barrette nasale à la forme du nez en pressant avec les deux mains.
- Placer les deux mains en coquille et inspirer fortement afin de vérifier que le masque est bien ajusté. Si l'air circule autour du nez, ajuster la barrette nasale.

La MSA intervient pour la Santé et la Sécurité au travail des exploitants, salariés et employeurs agricoles.

Les conseillers en prévention, les médecins et les infirmiers de santé au travail agissent pour améliorer les conditions de travail et prévenir les risques en agriculture.

N'hésitez pas à nous contacter

02 41 31 77 80

santesecurite@msa49.msa.fr



vous accompagner


Le risque poussière en élevage avicole

■ Votre santé et votre sécurité au travail



Conception : Communication MSA 49 - Photos Adobe Stock / MSA Armorique - Impression MSA49 - Novembre 2019

Les particules présentes dans l'atmosphère (poussières végétales, moisissures, acariens, bactéries...) pénètrent par les voies respiratoires et peuvent parvenir jusqu'aux poumons.



Quels sont les effets sur la santé ?

L'inhalation fréquente et prolongée de ces particules présentes dans l'atmosphère n'est pas sans conséquences sur la santé.

Cela peut entraîner une inflammation ou une allergie :

- ▮ Rhinite
- ▮ Asthme
- ▮ Bronchite chronique
- ▮ Bronchopneumopathie
- ▮ ...

Les signes qui doivent alerter :

- ▮ Éternuement
- ▮ Écoulement nasal
- ▮ Picotement oculaire, larmoiement
- ▮ Toux, crachat
- ▮ Gêne respiratoire
- ▮ Essoufflement
- ▮ Fièvre, frissons

Il est important de consulter votre médecin traitant et de prévenir de votre activité professionnelle aux contacts des volailles.

Quels sont les situations à risque ?



Les activités dans le bâtiment sont susceptibles de favoriser la mise en suspension des poussières dans les élevages : mise en place des litières, paillages, manipulation et soins aux volailles, nettoyage des bâtiments, ...

Le travail dans les couvoirs lors de l'éclosion, expose également à ces poussières.



Quelle protection ?

Le masque est le seul moyen de protection individuelle. Il est donc nécessaire de le porter pour se protéger. Il est conseillé de mettre un masque de type P2 pour les activités en élevage avicole.



ATTENTION

Les masques jetables

- ▮ Le masque est individuel et à usage unique.
- ▮ Vérifier la date de péremption sur l'emballage. À ne pas confondre avec le temps d'utilisation.
- ▮ Le masque doit être changé régulièrement. Une augmentation de la gêne respiratoire indique son colmatage : le masque est saturé. **Il faut le changer.**
- ▮ La barbe, même courte, réduit considérablement l'étanchéité du masque. Mieux vaut être rasé.
- ▮ Se laver les mains avant et après utilisation.