

Boala

- Ornitoza sau psitacoza* este o infecție transmisă de păsări, care de cele mai multe ori trece neobservată. Cu toate acestea ea poate provoca boli grave. Mai multe cazuri de infectare umană sunt înregistrate în Franța.
- Boala este cauzată de o bacterie (*Chlamydophila psittaci*), răspândită în lumea întreagă. Există mai multe tipuri de boli în funcție de specia de păsări.
- Boala se răspândește prin contact apropiat cu păsările infectate (bolnave sau nu) sau prin contact cu mediul lor contaminat (gunoi, spații, cuști...) în special cu rațe, curcani, papagali.

Care sunt simptomele bolii ?

Simptomele apar în medie la 5 până la 15 zile după contaminare.

Este vorba despre :

- O **gripa falsă** cu febră ridicată (> 39° C), dureri de cap, dureri musculare, tuse seacă ;
- Uneori conjunctivită ;
- În caz de complicații, leziuni pulmonare, (mai rar leziuni ale meningelor, ficatului, rinichilor, inimii).

Dacă apare oricare dintre aceste semne la câteva zile după o activitate riscantă sau o recentă achiziție de păsări :

- Nu trebuie de zis „va trece de la sine...” ;
- Un medic trebuie consultat cu **promptitudine**, informându-l cu privire la contactul cu păsările în zilele anterioare. Un tratament există, cu atât este mai eficient cu cât este administrat mai devreme.

* Psitacoza se referă la infecția care provine de la păsările familiei de papagali. Ornitoza este infecția care provine de la alte păsări.

Activitate riscantă

IN MEDIUL PROFESIONAL

Meserii legate de pasari vii si mediul lor contaminat

- Crescători, colectori de pasari de curte, transportatori, personal al abatorului de pasari (agatat, sangerare, penaj), personal de incubator ;
- Personal al magazinelor pentru animale de companie, centre de gradina ;
- Veterinari ;
- ...

Meserii legate de pasarile moarte

- Personalul care se ocupa de taiatul carni ;
- Personalul laboratorului de analize veterinare ;
- Veterinari ;
- Taxidermiști ;
- Personal de colectare și recuperare a penelor ;
- ...

Meserii expuse la excrementele păsărilor sălbatice

- Dulgher ce construiește acoperisuri... ;
- Instalatori de antene ;
- ...

PRINTRE POPULATIE IN GENERAL

- Proprietari de păsări de agrement (papagali...) sau de reproducere (rațe...).

Rareori se raportează contaminarea porumbeilor în oraș.

Masuri preventive

Măsuri generale de control

Acestea sunt dificil de practicat la animale din cauza frecvenței infecției fără semne de boală.

- **Respectarea igienei reproducerii** : optimizați condițiile de reproducere (evitarea stresului, supraaglomerarea...), curățarea și dezinfectarea spațiilor și echipamentelor.
- Izolarea păsărilor bolnave. Tratatul este posibil, dar pasările rămân infectate, de aceea e nevoie de izolare.
- Interzicerea importurilor de animale vii din țări din afara Uniunii Europene. O derogare este posibilă dacă importul pasărilor este urmat de un control sanitar și carantină.
- Supravegherea bolii animalelor prin declarație obligatorie.

Măsuri de protecție colectivă și individuală

- **Aerisiți** la primele posturi în abatorul de păsări.
- **Limitați suspensia de praf** și excremente (evitați agitarea păsărilor de curte, jeturile de apă la presiune ridicată în timpul curățării, umeziți cadavrele înainte de orice manipulare...).
- **Purtați un dispozitiv de protecție respiratorie** FFP2 pentru cele mai prăfuite activități profesionale (curățenie, colectare, primele abatoare...).
- În laborator, manipulați în conformitate **cu practicile de igienă de laborator**.



Bacteria

Unde se afla bacteria ?

- La multe specii de păsări domestice sau sălbatice : **rațe, curcani** și găște în special, găini, fazani, porumbei, struți... dar și **papagali**, canari, turturele...
- În excremente, secreții nazale, oculare, în țesuturile și sângele păsărilor infectate (bolnave sau nu).

În mediul exterior, bacteriile pot supraviețui mai mult de o luna în materie uscată..



Cum ajunge bacteria în organism ?

- Prin **inhalarea** prafului contaminat ;
- Prin contact apropiat: manipularea unei păsări infectate, a penelor acesteia sau a țesuturile sale, contactul gurii cu ciocul.

Pe de alta parte :

- Bacteriile **nu se transmit consumând carnea animalelor infe** ;
- Nu se transmite de la om la om.

În caz de febră sau simptom pulmonar, nu uitați sa :

- Consultați **imediat** medicul de familie ;
- **Specificați medicului activitatea dvs. profesională sau faptul ca dețineți o pasăre de plăcere sau de reproducere.**

În anumite condiții, această boală poate fi obiectul unei cereri de recunoaștere ca boală profesională de pacient sau de persoanele aflate în întreținerea acestuia.

Pentru a cunoaste mai multe

Sur internet :

www.msa.fr

www.inrs.fr

www.sante.gouv.fr

www.inma.fr



MSA Caisse Centrale
Les Mercuriales
40, rue Jean Jaurès
93547 Bagnolet Cedex



santé - sécurité au travail

Ornithose Psittacose

(*Chlamydophila psittaci*)



Boala si prevenirea ei



santé
famille
retraite
services